

činec (Mráz et Somo 1998 SAV). - Prakovce, pod Bielym kameňom (Mráz 1996 SAV). - Košovská hoľa, chata Erika (Základ 1941 BRA, BP). **16.** Muránska Huta, dolina potoka Župkov (Kocharová et Hrouda 1987 SLO, SAV). **21a.** Martinské hole (Futák 1942 SLO). **21b.** úpätie Malého Kriváňa (Margittai 1908 BP, BRA). - úpätie Veľkého Kriváňa (Maloch 1914 PRC). - Dolina Bystríčka (Margittai 1913 BP). **21c.** Biela voda (Margittai 1914 BP). - Vyšná Revúca (Polážkovics a. BRA). - Ľubochnianska dolina, nad horáňou Raková (Márholt 1985 SAV). **21d.** Sivý vrch N (Scheffler 1928 SLO). **22., 23a., 23b., 23c.** Mnoho lokalít vo vyšších polohách. **28.** Pilisko, Bystrý potok (Grulich 1989 MMI). - Babia hora, mnoho údajov.

Nepravdepodobný údaj: **24.** Poľana Huta (Gusta 1880 KRAM) - *Cardamine amara* subsp. *opicii* na tejto lokalite v súčasnosti nerastie, vyskytuje sa tu len *C. amara* subsp. *amara*, ide pravdepodobne o zámennu schedy.

9. *Cardamine parviflora* L.

Žerušnica malokvetá

Ic.: Tab. 39, fig. 1, p. 369

Cardamine parviflora L. Syst. Nat. 2, ed.10, p. 1131, 1759.

Jednoročná, 10–30(–40) cm vysoká bylina. Koreň tenký. Byľ priama, sprehýbaná, jednoduchá alebo väčšinou len v hornej polovici rozkonárená. Listy v čase kvitnutia bez prízemnej ružice. Byľové listy v počte 6–30, perovito strihané, holé, s 3–11 jarmami segmentov; segmenty obrátene kopijovité až čiarkovité, celistvo-krakové, na konci krátko hrotité. Strapec alebo strapcová metlina 5–150-kvetá. Kališné lístky s blanitým lemom, 1–1,3 mm dlhé. Korunné lupienky vzpriamené, obrátene kopijovité, 2–2,5(–3) mm dlhé, na vrchole zaokruhlené, biele. Tyčiniek 6; peľnice zlté. Čnelka s nerozšírenou polguľovitou blíznou. Stopky plodov šikmo odstávajúce. Šešule vzpriamené, 10–18×0,7–0,8 mm veľké.

Chrómový: $2n = 16$, okr. 8, Leles W, pri mlávom ramene rieky Tisá. - Vojany W, pri odbočke z cesty Vojany – Veľké Raškovce do Drahňova [obe Márholt Phyton (Horn) 34: 31, 1994].

Biológiu, ekoľogiu, fytočenológiu. Terofyt. Kvitnutie máj–jún. Rastie na otvorených stanovištiach rôzneho charakteru. Môžu to byť zamorené okraje polí, zamorené zníženiny v poli, brehy a obnažené dná rybníkov v planárnom stupni.

Celkové rozšírenie. Vyskytuje sa takmer v celej Európe, pričom chýba na niektorých ostrovoch a na väčšine Balkánskeho polostrova, zasahuje do severnej Afriky a do Ázie. Populácie v Severnej Amerike bývajú niekedy hodnotené ako samostatný taxón.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 60. V minulosti bol výskyt tohto druhu hojnnejšie dokumentovaný z Východoslovenskej nížiny. Ojedinely údaj, v súčasnosti nepotvrdený, je známy z Podunajskej nížiny. V posledných rokoch sa objavili aj lokality na Záhorskej nížine, kde sa v pohraničnej oblasti s Českou republikou a Rakúskom mierne šíri.